

# Forår i bigården


Det fantastiske ved bifamilier er deres evne til at gå ind og ud af dvale af dvale igen.

Larve

Marts: løft ikke på bierne



April: løft ikke på bierne



**M**odsat andre dyr, som går i dvale, kan bierne gå ud og ind af dvale næste så mange gange, det skal være. Det betyder at bierne med kort varsel kan sætte ind med træk, hvis det skulle blive godt vejr, og erantisserne blomstrer, og derpå gå tilbage i vinterklyngen, som vi siger inden for biavl. Nogle år kan vi se træk så tidligt som i februar. At bifamilien vågner af vinterdvalen og går ud af vinterklyngen, betyder ikke, at vi nu kan åbne til familien og flytte på tavlerne. Det er alt for tidligt. Er man nysgerrig efter at vide, om bierne lever, lægger man øret til stedet og knipser let på det med en finger, så vil bifamilien bruse let op.

## Første forårseftersyn

Først i marts er det tid til første eftersyn. Det er her, vi tjekker foderbeholdningen. Løft forsigtigt dækbræt eller dækbrædder og se, om der er fodertavler i og omkring klyngen af bier. Det er sjældent, at en bifamilie kører tør for foder i marts; men tjek alligevel. Gør det gerne i koldt vejr, da bierne da sidder stille. Åbn højest et minut. Se ned og lys evt. med en lygte og konstater, om der er fyldte fodertavler tæt på klyngen. Opstablingsstedet kan man veje, evt. løfte for at konstatere, om der er mad nok. Mangler der foder, må man fodre eller bedre skubbe en fyldt fodertavle eller to hen til klyngen, idet tomme tavler rykkes væk. Er foderbeholdningen i underkanten, skriver man det ned og tjekker igen ved 2. forårseftersyn. Ikke noget med at løfte op på tavler med bier.

## Andet forårseftersyn

Andet forårseftersyn finder typisk sted i april, når der for alvor er varme i luften, og vi flere dage i træk har oplevet træk og temperaturer over 12° C. Ved træk forstås masser af bier, der henter pollen og nektar. Igen tjekker vi, om der er foder nok, og igen fodrer vi eller rykker fodertavler hen til klyngen af bier. Det mest uheldige, der kan ske i april er, at bierne



har flyttet sig væk fra de sidste fyldte fodertavler, og det bliver bidende koldt. I den situation kan bierne dø med masser af foder i stedet. Derfor, ryk altid fyldte tavler hen til bierne. Bedst er det, at der er fyldte fodertavler foran bierne i trugstader og til højre for bierne i opstablingsstader. For det er den vej bierne bevæger sig, mens de går foråret i møde. Undgå at løfte tavler med bier op. Det kan føre til, at dronningen bliver ”nøglet”, og så er den bifamilie fortabt. Men sæt gerne dronetavle ind til yngellejet.

## Tredje forårseftersyn

Når stikkelsbærbusken blomstrer, er det tid til tredje forårseftersyn. Nu er vi i slut april eller start maj. Her er der ingen fare for, at dronningen bliver nøglet. Kig yngellejet igennem. Se om der er god æglægning og vær obs på bifamilier, hvor der går en dronemor og laver pukkelyngel. Små familier og familier uden en ordentlig dronning slås sammen to og to. En stor og stærk familie laver meget mere honning end to små, og så er det meget sjovere at arbejde med en bifamilie i god

udvikling. Det er ved tredje eftersyn, man renser bunden i trugstedet, hvis ikke bierne selv har løst opgaven, ligesom det er nu, dronetavlen sættes ind til yngellejet – hvis det ikke allerede er sket. Generelt skal man lade være med at forårsfodre, og slet ikke hvis det blot er for at være på den sikre side. Det fører let til sukkerforurening af den fine forårshonning. Tag hellere fra de rige og giv til de fattige. På den måde får man fjernet fodertavler, man alligevel skulle kassere, når foråret og trækket for alvor sætter ind.



Læs mere i Bi-Lex-Olsen og se Dorte Garrit og Peter Sjøgrens udvintrings-webinar:

<https://youtu.be/-zMRvsocSgc>